Prof. Dr. Alfred Toth

Auflösung von System-Verbänden

1. Im folgenden gehen wir von der dyadischen Systemrelation S* = [S, U(S)] aus (vgl. Toth 2015). System-Verbände sind demnach als Sonderformen von Objektverbänden (vgl. Toth 2016) definierbar, indem sie als 2-stellige Relationen von Objekten und ihren Umgebungen eingeführt werden können. Damit gibt es drei Möglichkeiten zur Auflösung von Systemverbänden: Die Elimination des Systems, die Elimination der Umgebung des Systems, und die Elimination sowohl des Systems als auch seiner Umgebung.

2.1. S → Ø

Rue Affre, Paris

2.2. U(S) → Ø

Färberstraße, 8008 Zürich

2.3. S* → Ø

Kattrepel, Hamburg (um 1900)

Kattrepel, Hamburg (2008)

Sog. Nagelhäuser treten also bei der 2. ontischen Strategie zur Auflösung von System-Verbänden auf.

Literatur

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Objekt-Verbände I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

19.10.2016