Prof. Dr. Alfred Toth

Biadessivität als Funktion der Lagerelation

1. Biadessivität ist eine nicht-invariante ontische Eigenschaft (vgl. Toth 2014). Ein Objekt C ist biadessiv gdw. C(adessA) und C(adessivB) gilt. Falls D = (A, C, B) mit V(A, C) = V(C, B) = Ø ist, sprechen wir von unvermittelter Biadessivität, falls V(A, C) = V(C, B) ≠ Ø ist, von vermittelter Biadessivität. Falls V(A, C) ≠ V(C, B) ist, sprechen wir von halbvermittelter Biadessivität.

2. Im folgenden setzen wir Biadessivität in funktionelle Abhängigkeit der 10 in Toth (2016, 2017) unterschiedenen ontischen invarianten Relationen:

1. Materialitätsrelation	6. Zentralitätsrelation
M = (Mat, Str, Obj)	$C = (X_\lambda, ,Y_Z, Z_\rho)$
2. Raumsemiotische Relation	7. Lagerelation
O = (Sys, Abb, Rep)	L = (Ex, Ad, In)
3. Topologische Relation	8. Ortsfunktionalitätsrelation
I = (Off, Hal, Abg)	Q = (Adj, Subj, Transj)
4. Systemrelation	9. Ordinationsrelation
S* = (S, U, E)	O = (Sub, Koo, Sup)
5. Randrelation	10. Possessiv-copossessive Relationen
R* = (Ad, Adj, Ex)	P = (PP, PC, CP, PP).

2.1. Biadess(Ex)

Rue Compans, Paris

2.2. Biadess(Ad)

Rue Ernestine, Paris

2.3. Biadess(In)

Per definitionem ausgeschlossen!

Literatur

Toth, Alfred, Biadessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014

Toth, Alfred, Grundlagen einer Modelltheorie der Ontik I-LVII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2016

Toth, Alfred, Das System der Raumsemiotik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

10.11.2019