Prof. Dr. Alfred Toth

Binding und bounding als semiotische Kategorien

1. Bekanntlich wird das Zeichen als triadische gestufte Relation über den drei Peircezahlen, von Bense auch Primzeichen genannt (vgl. Bense 1980)

$$P = (1, 2, 3),$$

d.h. durch

$$Z = (1 \subset ((1 \subset 2) \subset (1 \subset 2 \subset 3)))$$

eingeführt. Wie man sieht, kann man auf diese Weise die 1-, 2- und 3-stelligkeit der triadischen Teilrelationen sowie ferner ihr (transitives) Enthaltensein ineinander darstellen.

Aus der Menge der monadischen Peircezahlen wird die Menge ihrer dyadischen Subzeichen gebildet; diese sind also eine (echte) Teilmenge der kartesischen Produkte der P in sich ($S \subseteq P^2$). Sie sind ablesbar aus der von Bense (1975, S. 36-38) eingeführten semiotischen Matrix

	.1	.2	.3
1.	1.1	1.2	1.3
2.	2.1	2.2	2.3
3.	3.1	3.2	3.3 .

Was die semiotische Matrix präsentiert, ist nun im Grunde erstaunlich, denn es widerspricht in krasser Weise der Konzeption der selbstenthaltenden Menge Z, in der ja die 2 die 1 und die 3 sowohl die 2 als auch die 1 enthält. Es ist also unmöglich, aus der Relation $Z = (3, 2, 1)$ Permutationen Z' zu bilden, so daß diese Z' isomorph zu Z sind. So enthält z.B. in $\underline{P}(3, 2, 1) = (3, 1, 2)$ die 1 nicht die 3, daher können weiter 3 und 1 auch nicht in 2 enthalten sein. Was die semiotische Matrix offenbar enthüllt, ist eine sehr tief gelegene Schicht des Zusammenspiels von Bindung und Gebundenheit (engl. binding und bounding) im qualitativ-quantitativen Zahlbereich der Peircezahlen. Setzen wir B für binding und G für bounding, so erhalten wir

$$B(1) = \emptyset \quad G(1) = (2, 3)$$

$$B(2) = 1 \quad G(2) = 3$$

$$B(3) = 1, 2 \quad G(3) = \emptyset.$$

Daß (B, G) keine 2-wertige Konversion darstellt, erhellt also bereits auf der Stufe der P, denn für die Vereinigungsmengen VB und VG gilt: $V(B(x)) \cup V(G(x)) \neq P$.

Wenn wir nun von den P zu den $P \times P$ fortschreiten, so läßt sich jedes Paar $S = ((w.x), (y.z))$ darstellen durch

$$\begin{array}{cccc} (w \cdot x) & (x \cdot z) & (z \cdot x) & (z \cdot y) \\ \sqcup & \sqcup & \sqcap & \sqcap \\ (y \cdot z) & (y \cdot w) & (w \cdot y) & (x \cdot w), \end{array}$$

also durch die Inklusionsrelationen allein, d.h. eine monadische Teilrelation einer dyadischen Relation ist entweder B oder G. Vgl. etwa das konkrete Paar $S = ((1.1), (1.2))$:

$$\begin{array}{cccc} (1 \cdot 1) & (1 \cdot 2) & (1 \cdot 1) & (2 \cdot 1) \\ \parallel & \sqcup & \parallel & \sqcap \\ (1 \cdot 2) & (1 \cdot 1) & (2 \cdot 1) & (1 \cdot 1). \end{array}$$

Will man also die Valenz von Subzeichen auf nicht-triviale Weise darstellen, dann kann man zu ihrer Bestimmung die semiotischen Operatoren B und G benutzen:

$$V((1.1, 1.2)) = ((=, B), (=, G), (B, =), (G, =))$$

bzw. im abstrakten Schema

$$V((w.x), (y.z)) = ((\sqcup, \sqcup), (\sqcup, \sqcap), (\sqcap, \sqcup), (\sqcap, \sqcap)).$$

Auf nicht-triviale Weise, d.h. auf der Basis der beiden semiotischen Operatoren B und G anstatt auf Repräsentationswerten, kann semiotische Valenz (V) also als eine Quadrupelrelation

$$V = ((w.x), (y.z)), \sqcup, \sqcap, =)$$

definiert werden.

2. Bekanntlich lautet die abstrakte Definition einer Zeichenklasse

$$Zkl = (3.x, 2, y, 1.z),$$

d.h. ihre Konstanten sind

$$K_{Zkl} = (1., 2., 3.)$$

und ihre Variablen

$$V_{Zkl} = (x, y, z).$$

Durch Dualisation erhalten wir aus der Zkl ihre Realitätsthematik

$$\times Zkl = Rth = (z.1, y.2, x.3)$$

mit den Konstanten

$$K_{Rth} = (.1, .2, .3)$$

und den Variablen

$$V_{Rth} = (x, y, z),$$

d.h.

$$V_{Zkl} = V_{Rth},$$

aber

$$K_{Zkl} \neq K_{Rth}.$$

Die K_{Zkl} binden in den Triaden die trichotomischen Stellenwerte, die K_{Rth} werden in den Trichotomien von den triadischen Hauptwerten gebunden, d.h. wir haben

Zkl	
Bindende Kat.	Gebundene Kat.
K.	.n

Rth	
Bindende Kat.	Gebundene Kat.
n.	.K

$$Zkl = (\quad 3.B \quad x_G, \quad 2.B \quad y_G, \quad 1.B \quad z_G \quad)$$

$$Rth = (\quad z.G \quad 1_B, \quad y.G \quad 2.B \quad x.G \quad 3_G \quad).$$

Gehen wir nun über von diesem abstrakten Dualsystem zu einem konkreten. Als Beispiel diene die von Bense (1992) eingehend untersuchte dualidentische Zeichenklasse/Realitätsthematik der Eigenrealität:

$$Zkl = (\quad 3.B \quad 1_G, \quad 2.B \quad 2_G, \quad 1.B \quad 3_G \quad)$$

$$Rth = (\quad 3.G \quad 1_B, \quad 2.G \quad 2_B, \quad 1.G \quad 3_B \quad).$$

Hier gilt also:

$$(3.B \ 1_G) \neq (3.G \ 1_B)$$

$$(2.B \ 2_G) \neq (2.G \ 2_B)$$

$$(1.B \ 3_G) \neq (1.G \ 3_B).$$

G/B BLOCKIERT ALSO EIGENREALITÄT.

Im folgenden Dualsystem sind die GB-Isotopien rot und diejenigen der semiotischen Werte schwarz eingezeichnet.

d.h. das eigenreale Repräsentationssystem ist zwar nicht dualidentisch, aber gesamtssymmetrisch.

Literatur

Bense, Max, Vermittlung der Realitäten Baden-Baden 1976

Bense, Max, Die Eigenrealität der Zeichen. Baden-Baden 1992

Bense, Max, Die Einführung der Primzeichen. In: Ars Semeiotica 3, 1980, S. 287-294

Toth, Alfred, Das repräsentationstheoretische B/G-System. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2020

22.12.2020