

Dreistufige ontische Filterung von Lagerrelationen XXXII

1. Wie bereits in Toth (2016a) angedeutet, unterscheidet sich die Rand-Relation $R^* = [\text{Ad}, \text{Adj}, \text{Ex}]$ (vgl. Toth 2015a) von den übrigen 5 ontischen Relationen – darunter der Lagerrelation $L = [\text{Ex}, \text{Ad}, \text{In}]$ (vgl. Toth 2012) und der Ortsfunktionalitätsrelation $Q = [\text{Adj}, \text{Subj}, \text{Transj}]$ (vgl. Toth 2015b) – dadurch, daß sie im Gegensatz zu den letzteren eine Vorn-Hinten- bzw. Hinten-Vorn-Relation und also keine Links-Rechts- bzw. Rechts-Links-Relation ist. Nimmt man somit die beiden folgenden Abbildungen vor: $L \rightarrow R^*$ und $L \rightarrow Q$, so bekommt man orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerrelationen. Diese bereits in Toth (2016b) geübte Praxis wollen wir nun ausbauen zu einer dreistufigen ontischen "Filterung" von Lagerrelationen, und zwar in der folgenden Form

B		C		L
			$\nearrow$	Ex
Sys	$\rightarrow$	X_λ	$\rightarrow$	Ad
			$\searrow$	In,
			$\nearrow$	Ex
Abb	$\rightarrow$	Y_Z	$\rightarrow$	Ad
			$\searrow$	In,
			$\nearrow$	Ex
Rep	$\rightarrow$	Z_ρ	$\rightarrow$	Ad
			$\searrow$	In, usw.

2.1. $\text{Abb} \rightarrow Y_Z \rightarrow \text{Ex}$



Rue Lacépède, Paris

2.2. $\text{Abb} \rightarrow Y_Z \rightarrow \text{Ad}$



Rue du Ruisseau, Paris

2.3. $\text{Abb} \rightarrow Y_Z \rightarrow \text{In}$



Parc des Buttes-Chaumont, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, R^* -Lagerrelationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Orthogonale Doppelbestimmungen von Lagerrelationen I-VI. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

18.6.2016