

Prof. Dr. Alfred toth

Horizontale konkatenierte R*-Relationen

1. Nachdem in Toth (2015a) Kategorisierungen für vertikale konkatenierte R*-Relationen (vgl. Toth 2015b) präsentiert worden waren, wenden wir uns im folgenden Konkatenationen von horizontalen R*-Relationen zu. Sie haben die allgemeine Form

$$R^{**} = [Ex_i, Adj_i, Ad_i \equiv Ad_j, Adj_j, Ex_j].$$

Auch hier sind drei Kategorien zu unterscheiden, allerdings sind sie ontisch (nicht aber formal) von denjenigen der vertikalen verschieden.

2.1. $Ad_i \cap Ad_j = \emptyset$



Rue du Dr Labbé, Paris

2.2. $\text{Ad}_i \cap \text{Ad}_j \neq \emptyset$



Rue d'Avron, Paris

2.3. $\text{Ad}_j \subset \text{Ad}_i$



Rue Saint-Blaise, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Vertikale konkatenierte R^* -Relationen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

7.12.2015