Prof. Dr. Alfred Toth

Null- und Nicht-Null-Ränder bei raumsemiotischen Relationen I

1. Man kann innerhalb der in Toth (2015a) eingeführten R*-Stern-Relation bekanntlich nicht nur zwei, sondern drei Ränder bilden, sofern man von R*-Konkatenationen ausgeht (vgl. Toth 2015b). Wegen der in Toth (2015c) aufgezeigten Isomorphie zwischen R* = [Ad, Adj, Ex] und der Zeichenrelation Z = [M, O, I] ist es ferner möglich, innerhalb der drei von Bense unterschiedenen raumsemiotischen Kategorien (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) zwischen Null- und Nicht-Null-Rändern zu unterscheiden. Im folgenden werden die drei möglichen S-Ränder untersucht.

2.1. R[S, S]

2.1.1. Null-Ränder

Rue Pajol, Paris

2.1.2. Nicht-Null-Ränder

Rue Frédéric Sauton, Paris

2.2. R[S, Abb]

2.2.1. Null-Ränder

Impasse Dombasle, Paris

2.2.2. Nicht-Null-Ränder

Rue Saint-Jacques, Paris

2.3. R[S, Rep]

2.3.1. Null-Ränder

Rue Marie-Davy, Paris

2.3.2. Nicht-Null-Ränder

Rue Blainville, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Räbnder bei R*-Konkatenationen I-III. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Die Isomorphie der R*-Relation und der Zeichenrelation. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015c

1.1.2016