

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Verdoppelungen mit konstanter Randrelation

1. Werden ontische Elemente iteriert, so brauchen natürlich nicht alle Objektinvarianten (vgl. Toth 2013) "mitgeführt" zu werden. Diese Nicht-Mitführung ermöglicht ja gerade ontische Variation bzw. eine Filterung von Gleichheit. Im folgenden sei als Beispiel eine vollständige Tripelrelation mit konstanter Randrelation ($R^* = (Ad, Adj, Ex)$) gezeigt. Beispiele werden so gewählt, daß sich Kontraste anderer Relationen finden. Rein theoretisch können aus allen 18 Objektinvarianten eine oder mehrere Relationen konstant gesetzt oder variiert werden. Dadurch ergibt sich eine kombinatorisch enorm hohe Menge von Möglichkeiten, die allerdings ontisch praktisch nicht realisiert sind.

2.1. $Ad = \text{const.}$



Rue Germain Pilon, Paris

2.2. Adj = const.



Rue de Magdebourg, Paris

2.3. Ex = const.



Karl Stauffer-Str. 7, 8008 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

4.1.2017