

Prof. Dr. Alfred Toth

Optionale, obligatorische und variable R*-Adessivität

1. R*-Adessivität ist eine Form der ontischen Lagerrelationen, die als Teilrelation der in Toth (2015) definierten Randrelation $R^* = (Ad, Adj, Ex)$ fungiert. Im folgenden zeigen wir drei bisher wohl nirgendwo zusammen behandelte Fälle von objektaler R*-Adessivität. Sie bilden allerdings keine Ontose, da die Begriffe optional und obligatorisch im Gegensatz zur Variabilität keine Objektivinvariante sind (vgl. Toth 2013).

2.1. Optionale R*-Adessivität



Avenue Bosquet, Paris

mit R*-Adessivität, jedoch ohne solche im folgenden ontischen Modell



Rue Papillon, Paris.

2.2. Obligatorische R*-Adressivität



Hadwigstr. 6, 9000 St. Gallen

2.3. Variable R*-Adessivität



Trittbrett, DB (o. g. A.)

Literatur

Toth, Alfred, Objekttheoretische Invarianten II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2013

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

24.6.2018