

Prof. Dr. Alfred Toth

Paare von ungleich objektabhängigen Repertoires

1. Im folgenden betrachten wir n-tupel bzw. Paare von Repertoires, die sich durch den Grad ihrer Objektabhängigkeit unterscheiden (vgl. zuletzt Toth 2015). So ist in 2.1. die Umgebung des Systems vermöge $S^* = [S, U, E]$ 2-seitig objektabhängig, aber das Repertoire, das durch E von $U[S]$ getrennt ist, ist 0-seitig objektabhängig, da es ja nicht zu S^* gehört. Auch in 2.2. bildet das Podest mit den Tischen und Stühlen ein 2-seitig vom Restaurant objektabhängiges Repertoire, aber dessen Umgebung ist 1-seitig von ihm objektabhängig, da es eine Obermenge des ersteren Repertoires bildet. In 2.3. ist die Ausbuchtung ein 0-seitig vom Restaurantsystem objektabhängiges Repertoire, aber da es durch thematische Objekte aus dem Restaurant belegt ist, d.h. teilweise als Garten dient, ist dieser belegte Teil 1-seitig objektabhängig.

2.1. $O = (2, 0) / (0, 2)$



Impasse Chausson, Paris

2.2. $0 = (2, 1) / (1, 2)$



Rue du Faubourg Saint-Denis

2.3. $0 = (0, 1) / (1, 0)$



Boulevard de la République, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Raumsemiotische Repertoires als Funktionen gradativer Objekt-abhängigkeit. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

7.1.2016