Prof. Dr. Alfred Toth

R*-Ränder bei vertikaler Subjazenz III

1. Im folgenden wird die in Teilen I und II begonnene Untersuchung vertikaler Subjazenz (vgl. Toth 2015a) auf der Basis der in Toth (2015b) definierten Relation R* = [Ad, Adj, Ex] anhand von zweistufigen Systemen weitergeführt, d.h. solchen, bei denen vertikale subjazente Differenz besteht.

2.1. Linkssubjazente Differenz

2.1.1. Ontotopologisches Modell



2.1.2. Ontisches Modell

Rue de Saint-Pétersbourg, Paris

2.2. Rechtssubjazente Differenz

2.2.1. Ontotopologisches Modell



2.2.2. Ontisches Modell

Rue Philippe de Girard, Paris

2.3. Beidseitig subjazente Differenz

2.3.1. Ontotopologisches Modell



2.3.2. Ontisches Modell

Pestalozzistraße, München

Literatur

Toth, Alfred, R*-Ränder bei vertikaler Subjazenz I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

3.1.2016