

Prof. Dr. Alfred Toth

Raumsemiotische Determinationsfunktionen

1. Im folgenden wird eine raumsemiotische Determinationsfunktion in die Ontik eingeführt. Sie besagt, daß die von Bense (ap. Bense/Walther 1973, S. 80) als diskret eingeführten raumsemiotischen Objektkategorien (vgl. Toth 2015) durch andere raumsemiotische Objektkategorien zu einer Determinationsfunktion, die nicht mehr länger semiotisch diskret ist, erweitert wird. Die Konversion der Determinationsfunktion kann man entsprechend als Adaptationsfunktion definieren.

2.1. $\text{Det} = (S \rightarrow \text{Abb})$



Rue du Jour, Paris

2.2. $\text{Det} = (\text{Abb} \rightarrow S)$



Rue Tournefort, Paris

2.3. $\text{Det} = (S \rightarrow \text{Rep})$



Place de la Madeleine, Paris

2.4. Det = (Rep → S)



Rue de Belleville, Paris

2.5. Det = (Abb → Rep)



Rue Henry Monnier, Paris

2.6. Det = (Rep $\rightarrow$ Abb)



Rue Pierre Bonnard, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Grundlagen einer nicht-diskreten Raumsemiotik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

6.11.2015