Prof. Dr. Alfred Toth

S* und S bei Einbettungsrelationen mit Rändern

1. Die Fälle, die wir bislang für Einbettungsrelationen mit Rändern untersucht hatten (vgl. Toth 2014), betrafen Ränder als Teilmengen der betreffenden Systeme, d.h. R[S, U] ⊂ S bzw. R[U, S] ⊂ S und R[U, S] ⊂ U bzw. R[S, U] ⊂ U, und somit waren sie alle auf S ⊂ S* beschränkt. Ganz verschieden sehen jedoch die Fälle aus, wenn wir nun von S* ausgehen, d.h. mit allen relativ zu S und U zweimal 4 möglichen (adessiven und exessiven) Rändern R_i ⊂ S*.

2.1. S_{adRad}* = [S, R[S, [U]], [U]]

Gladbachstr. 119, 8044 Zürich

2.2. S_{adRex}* = [S, R[[U], S], [U]]

Erlenstr. 80a, 4058 Basel

2.3. S_{exRad}* = [[S], R[[S], U], U]

Hohenbühlstr. 5, 8032 Zürich

2.4. S_{exRex}* = [[S], R[U, [S]], U]

Zimmergasse 10, 8008 Zürich

2.5. $U_{adRad}^{*} = [U, R[U, [S]], [S]]$



Albisstr. 20, 8038 Zürich

2.6. $U_{adRex}^{*} = [U, R[[S], U], [S]]$

Orellistr. 7, 8044 Zürich

2.7. U_{exRad}^* = [[U], R[[U], S], S]

Guggachstr. 18, 8057 Zürich

2.8. U_{exRex}^* = [[U], R[S, [U]], S].

Heizenholz 4, 8049 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Einbettungsrelationen mit Rändern I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2014

13.11.2011