

Prof. Dr. Alfred Toth

Thematische Paarobjekte mit exessivem Teilobjekt?

1. Nachdem wir in Toth (2018a, b) thematische Paarobjekte der Form $P = (\Omega_i, \Omega_j)$ (vgl. Toth 2018c) untersucht hatten mit der Bedingung, daß eines der beiden Teilobjekte inessiv oder adessiv ist, stellt sich die Frage, ob es auch Paarobjekte mit der dritten möglichen Lagerrelation, der exessiven, gibt, d.h.

$\Omega_i = \text{exess}$

oder

$\Omega_j = \text{exess.}$

2.1. Exessivität bei PP-Relationen

In diesem Falle ist $\Omega_j = \emptyset$, d.h. es liegt ein triviales Paarobjekt vor.



Boulevard de Clichy, Paris (Moulin Rouge)

In allen übrigen möglichen Fällen nicht-trivialer Paarobjekte ist nur das Trägerobjekt exessiv, das „getragene“ Objekt aber adessiv, d.h. es liegt – je nachdem, welches Objekt als Referenzobjekt fungiert – adessive Exessivität oder exessive Adessivität vor.

2.2. Exessivität bei PC-Relationen (adessive Exessivität)



Rue du Faubourg Saint-Antoine, Paris

2.3. Exessivität bei CP-Relationen (adessive Exessivität)



Rue Xavier Privas, Paris

2.4. Exessivität bei CC-Relationen (excessive Adessivität)



Rue de Charenton, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Thematische Paarobjekte mit inessivem Teilobjekt. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018a

Toth, Alfred, Thematische Paarobjekte mit adessivem Teilobjekt. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018b

Toth, Alfred, Objektsyntaktische, objektsemantische und objektpragmatische Paarsysteme. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2018c

27.11.2018