


Prof. Dr. Alfred Toth

Zweidimensionale ontische Zählung VI

1. Im folgenden zeigen wir exemplarisch die in Toth (2017a) inaugurierte zweidimensionale ontische Zählung, und zwar anhand der $(5 \text{ mal } 6)/30 = 15$ möglichen Kombinationen abgeschlossener ontotopologischer Systeme mit abgeschlossenen Teilsystemen (vgl. Toth 2015a, 2017b)



Jedem dieser Paare

1+1

1+2 2+2

1+3 2+3 3+3

1+4 2+4 3+4 4+4

1+5 2+5 3+5 4+5 5+5

wird nun ein Zahlenfeld der ortsfunktionalen qualitativen Arithmetik (vgl. Toth 2015b) zugeordnet, wobei es sich bei den „inhomogenen“ Fällen (also allen außer 1+1, 2+2, 3+3, 4+4 und 5+5) um die Kombination verschiedener Zählweisen innerhalb eines einzigen Zahlenfeldes handelt. Dieses muß per definitionem bijektiv auf die ontischen Modelle, mit denen wir unsere zweidimensionale ontische Zählung illustrieren, abbildbar sein.

Adjazente Zählweise

x_i	y_j	y_i	x_j	y_j	x_i	x_j	y_i
\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_j	\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_i
	\times		\times		\times		
\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_j	\emptyset_i	\emptyset_j	\emptyset_i
x_i	y_j	y_i	x_j	y_j	x_i	x_j	y_i

Subjazente Zählweise

x_i	\emptyset_j	\emptyset_i	x_j	\emptyset_j	x_i	x_j	\emptyset_i
y_i	\emptyset_j	\emptyset_i	y_j	\emptyset_j	y_i	y_j	\emptyset_i
	\times		\times		\times		
y_i	\emptyset_j	\emptyset_i	y_j	\emptyset_j	y_i	y_j	\emptyset_i
x_i	\emptyset_j	\emptyset_i	x_j	\emptyset_j	x_i	x_j	\emptyset_i

Transjazente Zählweise

x_i	\emptyset_j	\emptyset_i	x_j	\emptyset_j	x_i	x_j	\emptyset_i
\emptyset_i	y_j	y_i	\emptyset_j	y_j	\emptyset_i	\emptyset_j	y_i
	\times		\times		\times		
\emptyset_i	y_j	y_i	\emptyset_j	y_j	\emptyset_i	\emptyset_j	y_i
x_i	\emptyset_j	\emptyset_i	x_j	\emptyset_j	x_i	x_j	\emptyset_i

2. Im folgenden Teil behandeln wir die ontische Kombination 2+2.

2.2. Subj(2+2)

2.2.1. Ontisches Modell



Rue de Saussure, Paris

2.2.2. Arithmetisch-topologisches Zahlenfeld

$$\begin{array}{ccccccc} 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_i \\ 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_i \\ & & \times & & \times & & \times & \\ 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_i \\ 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_j & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & 0^{1_1} \subseteq 1^{1_1} & \emptyset_i \end{array}$$

2.3. Transj(2+2)

2.3.1. Ontisches Modell



Rue Villiers de l'Isle Adam, Paris

2.3.2. Arithmetisch-topologisches Zahlenfeld

$$\begin{array}{ccccccc} 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_i \\ \emptyset_i & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_i & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 \\ & & \times & & \times & & \times & \\ \emptyset_i & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_i & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 \\ 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & \emptyset_i & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_j & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & 0^1_1 \subseteq 1^1_1 & \emptyset_i \end{array}$$

Literatur

Toth, Alfred, Grundlegung der ontisch-semiotischen Systemtheorie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015a

Toth, Alfred, Zur Arithmetik der Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

Toth, Alfred, Zweidimensionale qualitative Zahlen. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2017a

Toth, Alfred, Topologische Zahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2017b

3.1.2017