Prof. Dr. Alfred Toth

Zwischen Rand und Umgebung

1. Ganz egal, ob man in der allgemeinen Systemdefinition $S = [S, \mathcal{R}[S, U], U]$ setzt $\mathcal{R}[S, U] = 0$ oder $\mathcal{R}[S, U] \neq 0$ setzt (vgl. Toth 2012), kann die Differenz $U \setminus \mathcal{R}[S, U] = 0$ oder $U \setminus \mathcal{R}[S, U] \neq 0$ sein.

2.1. $U \setminus \mathcal{R}[S, U] = 0$

Nadelberg 34/Spalenberg 40, 4051 Basel

2.2. $U \setminus \mathcal{R}[S, U] \neq \emptyset$

2.2.1. Ohne Adsysteme

2.2.1.1. Einteilig

Allschwilerstr. 62, 4055 Basel

2.2.1.2. Mehrteilig

Im Glockenacker 35, 8053 Zürich

2.2.2. Mit Adsystemen

2.2.2.1. Einteilig

Tobelhofstr. 250, 8044 Zürich

2.2.2.2. Mehrteilig

Riedhofstr. 37, 8049 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

12.2.2014